



DEZINFEKČNÍ PROGRAM

	Přípravek	Koncentrace	Doba působení	Účinnost	Kdy	Jak
Ruce						
hygienická dezinfekce rukou	Sterillium® Sterillium® classic pure	konc.	30 s	A(B)TM(V)	před a po kontaktu s pacientem; po kontaktu s kontaminovanými místy; před výkony vyžadující aseptické podmínky, po kontaktu s tělními tekutinami	hygienická dezinfekce rukou - vtírat do rukou tak, aby byly po celou dobu aplikace vlhké
	Sterillium® med	konc.	30 s	ABTMV		
mytí	Baktolin® pure				na začátku pracovní směny; při znečištěných rukách; po použití toalety; před jídlem	nanést na mokré ruce, napěnit, opláchnout
péče a regenerace	Baktolan® lotion (pure)				při pocitu vysušených rukou, několikrát za směnu	vetřít do suchých rukou
	Baktolan® balm (pure)					
Kůže, sliznice a rány						
	Cutasept® F	konc.	15 s - 1 min	A(B)T(V)	před vpichem injekce; před zavedením kanyly	nanést rozprašovačem, rozetřít tampónem
Nástroje						
běžné nástroje (nůžky, pinzety, skalpely,...)	Bomix® plus	0.50%	15 min	A(B)(V)	ihned po použití nástroje	rozevřený nástroj vložit do roztoku, po uplynutí expoziční doby vyjmout, opláchnout a osušit
		2.00%	5 min			
Plochy						
rychlá dezinfekce	Bacilloi® AF	konc.	30 s	A(B)TM(V)	po kontaminaci plochy	nastříkat na celou plochu, rozetřít otřít pečlivě povrch utěrkou a ponecha vlhké po celou expoziční dobu
	Bacilloi® 30 Sensitive Tissues	utěrka	30 s	A(B)(V)		
	Mikrobac® Tissues	utěrka	30 s	A(B)(V)		
dezinfekce s čistícím účinkem	Mikrobac® forte	0.5%	60 min	A(B)(V)	všechny prostory - denně na vlhko pracoviště intenzivní péče, odběrová místa, laboratoře, dětská oddělení - 3x denně	dezinfikovat metodou navlhčit - rozetřít; neosušovat
		1%	30 min			
		2.5%	60 min	A(B)TM(V)		
	Kohrsolin® FF	0.5%	60 min	A(B)(V)		
		1%	15 min			
		1.5%	60 min	A(B)(V)		
BODE X-Wipes - systém jednorázových utěrek k plošné dezinfekci						
role 90 utěrek	Mikrobac® forte	20 ml / 3 l	60 min	A(B)(V)	po kontaminaci plochy, povrchu nebo zdravotnického prostředku	pomocí utěrky otřít povrchy a plochy, zdravotnické prostředky; doba použitelnosti roztoku: 28 dní
		40 ml / 3 l	30 min			
	Kohrsolin® FF	40 ml / 3 l	15 min	A(B)(V)		
role 40 utěrek	Bacilloi® AF	3 l	30 s	A(B)TM(V)		
		Mikrobac® forte	10 ml / 1,5 l	60 min		
		20 ml / 1,5 l	30 min			
	Kohrsolin® FF	20 ml / 1,5 l	15 min	A(B)(V)		
		1,5 l	30 s	A(B)TM(V)		
A	baktericidní (vč. MRSA) podle ČSN EN 13727, ČSN EN 14561, ČSN EN 1499, ČSN EN 1500, ČSN EN 1279 (<i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Pseudomonas aeruginosa</i> , <i>Enterococcus hirae</i> , ev. <i>Escherichie coli</i>)					
(V)	fungicidní na kvasinky podle ČSN EN 13624, ČSN EN 14562 (<i>Candida albicans</i>)					
(B)	virucidní na obalené viry vč. HBV, HIV, HCV podle DVV (<i>Vacciniavirus</i> , <i>BVDV</i>)					
B	virucidní podle ČSN EN 14476 (adenovirus, poliovirus, MNV)					
T	tuberkulocidní podle ČSN EN 14348, ČSN EN 14563 (<i>Mycobacterium terrae</i>)					
M	mykobaktericidní podle ČSN EN 14348, ČSN EN 14563 (<i>Mycobacterium terrae</i> , <i>Mycobacterium avium</i>)					
V	fungicidní podle ČSN EN 13624, ČSN EN 14562 (<i>Candida albicans</i> , <i>Aspergillus niger</i>)					